

## بررسی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول مخروط افکنه‌ها

( مطالعه‌ی موردی: مخروط افکنه‌های دامنه تاقدیس قلاجه )

دکتر مهران مقصودی (استادیار دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول)

Maghsoudi@ut.ac.ir

سجاد باقری (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران)

مسعود مینائی (دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS&RS) - دانشگاه تهران)

Minaiy.Gis@gmail.com

### چکیده

تاقدیس قلاجه در جنوب استان کرمانشاه با روند شمال غربی - جنوب شرقی کشیده شده است. با توجه به استمرار فعالیت‌های تکتونیکی در دوران کواترنر و عصر حاضر در منطقه‌ی مورد مطالعه، مخروط افکنه‌های منطقه شواهد خوبی برای بررسی این گونه حرکات اند. با توجه به این که ویژگی‌های مورفولوژی مخروط افکنه‌ها در کنار سایر عوامل تأثیرگذار بر آنها، به شدت تحت تأثیر فعالیت‌های تکتونیکی قرار دارند، هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تکتونیکی در شکل‌گیری و تحول مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه است. در این پژوهش نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، عکس‌های هوایی و تصاویر سنجنده IRS منطقه، به عنوان داده‌های اصلی تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه از نزدیک و به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( $Lat^*$ ,  $Smf^*$ ,  $Vf^*$ ,  $Sl^*$ ) میزان فعالیت‌های تکتونیکی در منطقه بررسی شد و سپس فرمول  $Af^*$  و  $\beta$  مخروط افکنه‌های منطقه محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تکتونیک منطقه (گسل‌ها) نقش اصلی را در شکل‌گیری و تحول مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه دارند. به گونه‌ای که با حذف سازند آسماری و رخنمون شدن سازندهای سست گوربی - پابده، توسط راندگی گیلان غرب، بیشتر مخروط افکنه‌های منطقه در امتداد این گسل شکل گرفته اند. نحوه‌ی قرار گرفتن مخروط افکنه‌ها با فعالیت‌های تکتونیکی دوران پلیو - کواترنر منطقه هم‌خوانی کامل دارد. در سطح مخروط افکنه‌های منطقه سه فاز نهشته گذاری قابل

تشخیص است که نشان دهنده‌ی سه فاز بالا آمدگی در دوران کوتاه‌تر در منطقه می باشد. ویژگی‌های مورفومتری و مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه توسط تکنیک کنترل می شود.  
**کلید واژه‌ها:** تکنیک، مخروط افکنه، تاق‌دیس قلاجه، مورفوتکنیک

## درآمد:

از لندفرم‌های معمول در جبهه‌ی کوهستان‌ها، مخروطه افکنه‌ها هستند که در اثر کاهش ناگهانی قدرت رودخانه در نتیجه تغییر شیب توپوگرافیک به وجود می آیند (بول<sup>۱</sup>؛ ۱۹۷۹) به نقل از (ویلار<sup>۲</sup> و رویز<sup>۳</sup>: ۲۰۰۰: ۱۲۷). رودخانه‌ها هنگام عبور از دره‌های پرشیب و باریک و ورود به دره‌های بزرگتر و بازتر و یا ورود به دشت، مقداری از بار رسوبی خود را به صورت عارضه‌ی مخروطی شکل به جا می نهند که راس آن به سمت بالادست رودخانه بوده و مخروط افکنه نامیده می شود (اسمال<sup>۴</sup> و ویتریک<sup>۵</sup>، ۱۹۹۱) به نقل از (عباس نژاد: ۱۳۷۵: ۱۴۹). پژوهشگران زیادی در جهان و ایران نقش تکنیک در شکل گیری و تحول مورفولوژی مخروطه افکنه‌ها را مورد توجه قرار داده اند که از جمله‌ی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: بول و هاروی<sup>۶</sup> ۱۹۸۹؛ فراسر و دکلسی<sup>۷</sup> ۱۹۹۲؛ سیلو<sup>۸</sup> ۱۹۹۲؛ کالواچ و همکاران<sup>۹</sup> ۱۹۹۷؛ ابراهام<sup>۱۰</sup> ۲۰۰۰؛ هاروی<sup>۱۱</sup> ۲۰۰۱؛ ویسرس و همکاران<sup>۱۲</sup> ۲۰۰۲؛ نوآ<sup>۱۳</sup> ۲۰۰۳؛ عباس نژاد<sup>۱۴</sup> ۱۳۷۵؛ یمانی و مقصودی ۱۳۸۲؛ خیام و مختاری ۱۳۸۲؛ کی نژاد ۱۳۸۲؛ کرمی و رجایی ۱۳۸۳؛ رضایی مقدم و همکاران ۱۳۸۴؛ عابدینی و رجایی ۱۳۸۵.

۱- Bull

۲- Villar

۳- Ruiz

۴- Small

۵- Witherick

۶- Bull and Harvey

۷- Fraser and Decelles

۸- Silva

۹- Calvache

۱۰- Abraham

۱۱- Harvey

۱۲- Viseras

سطوح آبرفتی می‌توانند به عنوان خطوط زمانی، هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرند تا زمان حرکت گسل‌ها و رخداد زلزله‌های قدیمی را مشخص کنند (بول<sup>۲</sup>: ۱۹۹۶) به نقل از (لی و همکاران<sup>۳</sup>: ۱۹۹۸: ۲۹۹). مخروط افکنه‌ها به عنوان یکی از بارزترین اشکال آبرفتی، مورفولوژی و تحول آنها به شدت تحت تأثیر حرکات تکتونیکی قرار می‌گیرند. حرکات تکتونیکی سطح اساس فرسایش را تغییر داده و فرایندهای فعال در سطح مخروط افکنه‌ها و تکامل آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند (یانگ<sup>۴</sup>: ۱۹۸۵: ۱۰). با توجه به وجود حرکات تکتونیکی فعال در دوران پلیو - کواترنر و ادامه‌ی این حرکات در عهد حاضر (هولوسن)، در زاگرس و منطقه‌ی مورد مطالعه، مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه می‌تواند راهنمای خوبی برای شناسایی این حرکات باشند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تکنیک در شکل گیری و تحول مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه و اثبات وجود حرکات تکتونیکی در دوران کواترنر و ادامه‌ی آنها در زمان حاضر در منطقه‌ی مورد مطالعه می‌باشد.

منطقه‌ی مورد مطالعه، در زاگرس شمال غربی و از لحاظ زمین شناسی در زون چین‌های برگشته (شدیدا چین خورده) واقع شده است. با توجه به شواهد مورفوتکتونیکی و ثنوتکتونیکی وجود و تداوم فعالیت‌هایی تکتونیکی در منطقه در محدوده‌ی زمانی کواترنر آشکار بوده و حداقل سه فاز بالا آمدگی در منطقه قابل تشخیص است (میرشکرانی: ۱۳۷۶: ۹۳). دگرریختی حاصل از هم‌گرایی صفحه عربی - اوراسیا در زاگرس شمال غربی به وسیله‌ی ترکیبی از کوتاه شدگی شمال شرق - جنوب غرب و حرکات امتداد لغز راست بر گسل‌های معکوس (راندگی‌ها) نمود دارد (بلانک، ۲۰۰۳: ۴۰۱). میزان کوتاه شدگی در زاگرس شمال غربی ۳ تا ۵ میلی‌متر در سال است (ورنر، ۲۰۰۴) به نقل از (حسامی و همکاران: ۲۰۰۶: ۱۴۳).

منطقه‌ی مورد مطالعه در غرب کشور در جنوب استان کرمانشاه و شمال استان ایلام واقع شده است و منطبق بر محدوده‌های سیاسی شهرستان گیلان غرب و شهرستان شیروان چرداول است. منطقه‌ی مورد مطالعه بین عرض‌های جغرافیایی ۳۳° ۵۲' تا ۳۴° ۱۳' شمالی و طول‌های جغرافیایی ۴۶° ۳۰' تا ۴۶° ۳۰'.


۱ - Nah

۲ - Bull

۳ - Li

۴ - Yang

شرقی واقع شده است (شکل ۱). مهم‌ترین شهرهای نزدیک به منطقه‌ی مورد مطالعه عبارت‌اند از: گیلان‌غرب در غرب منطقه، اسلام‌آباد در ۲۵ کیلومتری شمال منطقه و شهر سرابله در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی. همچنین راه ارتباطی گیلان‌غرب و ایلام به اسلام‌آباد از منطقه‌ی مورد مطالعه عبور می‌کند.



شکل ۱: نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

## مواد و روش‌ها:

به منظور مطالعه و بررسی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول مورفولوژی مخروط افکنه‌های دامنه‌های طاق‌دیس قلاجه، با توجه به اهداف تحقیق شانزده مخروط افکنه شاخص منطقه‌ی انتخاب شد، سپس با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، موقعیت مخروط افکنه‌ها و حوضه‌ی آبریز آنها مشخص گردید. نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، عکس‌های هوایی ۱:۵۵۰۰۰ سال ۱۳۳۵، نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ و تصاویر سنجنده IRS منطقه، به عنوان ابزار اصلی تحقیق در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به پیچیدگی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول نقش مخروط افکنه‌ها، بازدیدهای میدانی مکرر به منظور بررسی ویژگی تک‌تک مخروط افکنه‌های منطقه انجام گرفت و از ویژگی‌های مورفولوژی و سطوح انباشتی - کاوشی مخروط افکنه‌های منطقه عکس برداری به عمل آمد.




جهت برآورد میزان فعالیت‌های تکتونیکی منطقه از شاخص‌های ژئومورفولوژیکی  $Lat, Smf, Vf, SI$  استفاده شد. شاخص  $\beta$  به منظور محاسبه‌ی خمیدگی مخروط افکنه‌های منطقه تحت تأثیر تکنیک محاسبه گردید. با استفاده از نرم افزارهای SPSS ۹,۳، ArcGIS ۹,۳ و ENVI ۴,۳ روابط آماری مورد نظر تعیین و نقشه‌ها و نیمرخ‌های لازم ترسیم گردید.

### یافته‌های تحقیق

#### ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌ها در هر منطقه متأثر از ویژگی‌های حوضه‌های تغذیه کننده خود هستند. نتایج تحلیل‌های تفکیک کننده بر اساس متغیرهای مخروط افکنه‌ها و حوضه‌ی آبریز آنها نسبت به بررسی‌هایی که تنها بر اساس تحلیل متغیرهای مخروط افکنه‌ها صورت گرفته اند، پراهمیت‌اند. این بدان معنی است که تعیین اختلافات ما بین ویژگی مخروط افکنه‌ها و حوضه‌ی آبریز بسیار بهتر از تفاوت‌های بین ویژگی‌های خود مخروط افکنه‌ها است. (والو و همکاران؛ ۱۹۹۷: ۱۶۹). ویژگی مورفومتری مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه و حوضه‌های آبریز آنها در جدول (۱) آمده است. رسوبات مخروط افکنه‌های منطقه به صورت ترکیبی از قطعه سنگ، قلوه سنگ، شن، ماسه، رسوبات ریز دانه، رس و سلیت می باشد. شکل شماره ۲ نقشه‌ی پراکندگی مخروط افکنه‌ها را در منطقه‌ی مورد مطالعه نشان می‌دهد و شکل شماره ۳ نقشه‌ی ژئومورفولوژی منطقه‌ی مورد مطالعه را ارائه نموده است.



شکل ۲: نقشه موقعیت مخروط افکنه‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه و موقعیت مخروط افکنه‌ها نسبت به گسل‌های منطقه



شکل ۳: نقشه ژئومورفولوژی منطقه‌ی مورد مطالعه و موقعیت پدیده‌های مختلف موجود در منطقه



ژئومورفولوژی حوضه‌های بالادست آنها و طبیعت محیط‌های پیوسته کنترل می‌شود (ریترو و همکاران، ۲۰۰۱: ۶۴). تکنونیک مسئول اصلی ایجاد ناهمواری‌های تأثیرگذار در تشکیل مخروط افکنه‌هاست و بالا آمدگی مداوم منطقه موجب فراهم آوری رسوب زیاد و مداوم خواهد بود. (هاروی و همکاران؛ ۱۹۹۹). عوامل تکنونیک، بافت، زمینه و جایگاه مخروط افکنه‌ها را متأثر می‌سازند (سیلو؛ ۲: ۱۹۹۲). همچنین به طریقی بالا آمدگی، شیب و ویژگی‌های سطح اساس را متأثر می‌سازند (کالواچ؛ ۳ و همکاران؛ ۱۹۹۷) به نقل از (هاروی؛ ۲۰۰۰: ۶۸). بالا آمدگی کوهستان در مناطقی که جبهه‌ی کوهستان گسلی می‌باشد، باعث تغییر شیب مخروط افکنه‌ها و تغییر مکان رسوب‌گذاری و تغییر مساحت مخروط افکنه می‌شود. در نواحی تکنونیک فعال، تکنونیک تشکیل ناهمواری‌ها و در نتیجه موقعیت و تا اندازه‌ای تمام شکل مخروط افکنه را کنترل می‌کند (هاروی؛ ۴؛ ۲۰۰۱: ۶۸). تکنونیک عامل اصلی در شکل‌گیری و تکامل مخروط افکنه‌های منطقه مورد مطالعه است. نقش تکنونیک در شکل‌گیری مخروط افکنه‌های مورد مطالعه را به طور کلی می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود: ۱. نقش گسل‌ها و درزه‌ها ۲. نقش بالا آمدگی

### ۱. گسل‌ها و درزه‌ها

سازند آسماری به عنوان سازند اصلی منطقه به دلیل سخت و شکننده بودن آن، در اثر فشار نیروهای تکنونیک به هنگام چین خوردگی و ادامه‌ی حرکات زمین ساختی گسل خورده و با تراکم گسلی ۰/۶۸ کیلومتر در کیلومتر مربع به صورت زون تکنونیک خُرد شده‌ای درآمده است. راندگی گیلان غرب به دو صورت در شکل‌گیری مخروط افکنه‌های شماره ۱ الی ۷ که وسیع‌ترین مخروط افکنه‌های منطقه‌اند، تأثیر گذار بوده است:

۱. حذف سازند آسماری و رخنمون ساختن سازندهای سست گورپی و پابده؛

۱ - Ritter et al., ۲۰۰۰.

۲ - Silva et al., ۱۹۹۲.

۳ - Calvache et al., ۱۹۹۷.


۴ - Harvey, ۲۰۰۱.

۲. بالا آمدگی کوهستان در محل راندگی و افزایش شیب توپوگرافی منطقه و در نتیجه فرسایش بیشتر سازندهای سست منطقه.

بیشتر مخروط افکنه‌های شاخص منطقه در خروجی دره‌های گسلی منطقه شکل گرفته اند. شکل (۲) موقعیت مخروط افکنه‌های شاخص و گسل‌های منطقه را نشان می دهد. جدول (۲) تعداد و رتبه ی آبراهه‌های تغذیه کننده ی مخروط افکنه‌های منطقه که از مسیر گسل‌ها پیروی می کند را نشان می دهد و وضعیت شبکه‌ی هیدروگرافی در شکل شماره ۴ نشان داده شده است. عبور آبراهه‌های اصلی دره‌ها در امتداد بخش دپرسیون خطوط گسل‌ها و از مناطق خرد شده تکنیکی حاصل از فعالیت گسل‌ها زمینه‌ی تدارک مقادیر زیاد رسوب را برای مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه فراهم نموده، به گونه‌ای که رسوبات خرد شده آهکی زاویه دار را می توان در سطح مخروط افکنه‌ها به فراوانی مشاهده نمود و این موضوع نقش زیادی در تشکیل و توسعه‌ی این مخروط افکنه‌ها داشته است.

جدول ۲: تعداد و رتبه‌ی آبراهه‌های تغذیه کننده‌ی مخروط افکنه‌ها که از مسیر گسل‌ها پیروی می کنند

شماره مخروط افکنه	آبراهه رتبه ۱	رتبه ۲	رتبه ۳
۸	۱	۱	۱
۱۰	۱	-	-
۱۱	-	۲	۱
۱۳	۲	-	-
۱۴	۱	-	-
۱۵	۲	۲	-
۱۶	۲	۱	-



شکل ۴: شبکه هیدروگرافی در منطقه مورد مطالعه و رتبه بندی آن

در تاقدیس قلاجه خطواره‌ها با جهت  $30^{\circ}N-40^{\circ}E$  بر محور تاقدیس عمود و از نوع درزه‌های کششی و پرمانداند. جهت جغرافیایی این درزه‌ها با امتداد دره‌های گسلی منطقه هم‌خوانی داشته و در نتیجه بر اثر فرایند کریوکلستی درزه‌ها، نقش قابل ملاحظه‌ای در فراهم آوری رسوب در منطقه دارند.

## ۲. نقش بالا آمدگی

در مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه، سه فاز بالا آمدگی مربوط به دوران پلیو-کواترنریه صورت سه سطح نهشته گذاری قابل تشخیص‌اند (شکل ۳)

سطح شماره سه به عنوان جدیدترین مرحله‌ی رسوب گذاری با وسعت کم و رسوبات درشت دانه و زاویه‌دار با مساحتی بین ۱۰ تا ۳۰ مترمربع در قسمت رأس مخروط افکنه‌ها با ضخامت یک متر قابل تشخیص است. سطح شماره ۲ با رسوبات درشت دانه با گردشگی متوسط و لایه‌های سیمانی کم با وسعت ۳۰ تا ۷۰ مترمربع و ضخامت ۱٫۵ در قسمت‌های رأس و به طور واضح تر در بخش میانی مخروط قابل تشخیص هستند. سطح ۳ به عنوان قدیمی‌ترین سطح، با رسوبات متوسط تا درشت دانه با گردشگی زیاد با وسعت ۸۰ تا ۱۴۰ مترمربع و ضخامت ۲ متر در امتداد آبراهه اصلی که مخروط افکنه‌ها را بریده‌اند، قابل

شناسایی می باشند (شکل ۵). مخروط افکنه‌های منطقه در زمان حاضر در فاز فرسایشی قرار دارند و رسوب گذاری در سطح آنها صورت نمی گیرد. محاسبه‌ی شاخص SI رودخانه‌های چله: ۲۳۴، رودخانه‌ی کفرآور: ۱۴۱، گوآور: ۷۴ و آسمان آباد: ۷۰ حاکی از ادامه بالا آمدگی منطقه در زمان حاضر است که نشان دهنده‌ی تأثیر این عامل در تحول مخروط افکنه در زمان حاضر است.



شکل ۵. سطوح انباشتگی تشخیص داده شده در سطح مخروط افکنه‌ی شماره ۹، شمال دشت چله (دید روبه شمال).

### تأثیر تکنیک بر مورفولوژی و ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌های مورد مطالعه:

مورفولوژی مخروط افکنه‌ها، به ویژه شیب آنها، رژیم فرایندهای مسلط را نشان می دهد (هاروی و همکاران؛ ۱۹۹۹). تکنیک در دو حالت بر مخروط افکنه‌ها تأثیر گذار است:

۱. تکنیک با تأثیر گذاری بر ویژگی‌های مورفومتری حوضه‌های آبریز تغذیه کننده مخروط افکنه‌ها، ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌ها را متأثر می سازد. در منطقه‌ی مورد مطالعه تکنیک با رخنمون کردن سازندهای سست (پابده و گورپی) و خرد کردن سازندهای سخت (آسماری) و همچنین فعالیت‌های نئوتکتونیک بر ویژگی‌های مورفومتری مورفولوژی مخروط افکنه‌ها تأثیر گذار بوده است.
۲. تکنیک می تواند به طور مستقیم بر ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌ها تأثیر بگذارد. جابه جایی و حرکت گسل‌ها باعث انحراف آبراهه‌های تغذیه کننده و در نتیجه متروک شدن قسمت یا کل

مخروط افکنه‌ها می‌شود. تکتونیک با چین دادن مخروط افکنه‌ها ویژگی‌های مورفومتری و مورفولوژی مخروط افکنه‌ها را به شدت تغییر می‌دهد. در زیر به بررسی ویژگی‌های مورفومتری و مورفولوژیکی مخروط افکنه‌های منطقه، که متأثر از فعالیت تکتونیکی منطقه است، می‌پردازیم.

### تأثیر تکتونیک بر تغییرات عمودی اندازه رسوبات مخروط افکنه‌ها:

در مخروط افکنه‌ها با توجه به شرایط آب و هوایی، وجود فعالیت‌های تکتونیکی و میزان فعالیت‌های تکتونیکی اندازه رسوبات در یک مقطع عمودی از پایین به بالا متغیر است. در شرایط تکتونیکی فعال اندازه‌ی رسوبات به سمت بالا افزایش می‌یابد (هاوارد؛ ۱۹۸۷) به نقل از (عباس نژاد؛ ۱۳۷۵: ۱۶۷). در منطقه مورد مطالعه در تمامی مقاطع ایجاد شده در مخروط افکنه‌ها به منظور ایجاد کانال و سیل بند اندازه رسوبات در مقطع عمودی به سمت بالا افزایش می‌یابد. همان گونه که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، رسوبات نزدیک به سطح مخروط افکنه‌ها در حد قله و قطعه سنگ‌اندولی به طرف عمق از اندازه‌های آنها کاسته می‌شود که نشان دهنده وجود حرکات تکتونیکی در زمان شکل‌گیری مخروط افکنه‌های منطقه است. به عبارت دیگر وجود فازهای بالا آمدگی ناشی از حرکات تکتونیکی منجر به چنین وضعیتی می‌شود. شایان ذکر است که عدد ۱/۵ ارائه شده در شکل ۶ تنها مربوط به یک فاز است که در اواخر آن شدیدتر بوده و توانسته است رسوبات دانه درشت‌تر را به سطح بیاورد.



شکل ۶: نمایی از تراشه ایجاد شده در مخروط افکنه‌ی شماره ۷ که در آن قرارگیری رسوبات درشت دانه در قسمت بالا قابل مشاهده است




### تأثیر تکنیک بر تعداد آبراهه‌های تغذیه کننده مخروط افکنه‌ها:

برخی از مخروط افکنه‌ها، به ویژه آنها که در امتداد گسل‌های فعال تشکیل می‌شوند، اغلب تنها دارای یک آبراهه‌ی اصلی تغذیه کننده‌اند (هاروی؛ ۱۹۸۷) به نقل از (عباس نژاد؛ ۱۳۷۵: ۱۷۹) در نواحی دارای حرکات تکنیک فعال نهشته گذاری در رأس مخروط افکنه‌ها صورت می‌گیرد. که باعث پر شدن جبهه کوهستان (رأس مخروط افکنه) توسط رسوب می‌شود. پر شدن جبهه‌ی کوهستان باعث کاهش رده شاخه‌های کانال‌های تغذیه کننده مخروط افکنه می‌شود و علت آن هم پر شدن کانال‌های تغذیه کننده قدیمی با رده‌های بالا، به وسیله‌ی رسوب گذاری مخروط افکنه‌ها که در نتیجه مخروط افکنه مستقیماً با رده‌های جدید تر برخورد می‌کند (والو و همکاران ۱۹۹۸: ۱۶۹). تعیین تعداد آبراهه‌های تغذیه کننده مخروط افکنه‌ها و رده آنها نشان دهنده تأثیر تکنیک بر مخروط افکنه‌های منطقه است جدول شماره ۳، تمامی مخروط افکنه‌های منطقه دارای یک آبراهه‌ی تغذیه کننده‌ای اصلی هستند (شکل ۷ و ۸).

جدول ۳: تعداد آبراهه‌های تغذیه کننده و رتبه‌ی هر آبراهه

شماره مخروط افکنه	تعداد آبراهه تغذیه کننده	رتبه‌ی آبراهه‌ی تغذیه کننده‌ی جدید	رتبه آبراهه‌ی تغذیه کننده قدیمی
۱	۱	۲	۳
۲	۱	۳	۴
۳	۱	۳	۴
۴	۱	۳	۵
۵	۱	۲	۳
۶	۱	۱	۳
۷	۱	۲	۳
۸	۱	۲	۳
۹	۱	۲	۳
۱۰	۱	۲	۲
۱۱	۱	۲	۲
۱۲	۱	۲	۲
۱۳	۱	۲	۲
۱۴	۱	۱	۲
۱۵	۱	۲	۲
۱۶	۱	۳	۳




شکل ۷: آبراهه‌های اصلی تغذیه کننده‌ی مخروط افکنه‌های شماره ۸ و ۹ را نشان می‌دهد.



شکل ۸: نمایی از آبراهه اصلی تغذیه کننده، عدم تقارن مخروط افکنه بر اثر حرکات راندگی گیلانغرب و قرار گرفتن قسمت فعال مخروط افکنه در غرب مخروط در شمال دشت چله (دید روبه شمال)

### تأثیر تکتونیک بر قسمت‌های فعال مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه از نظر شکل جزو مخروط افکنه‌های تودرتو هستند. در مخروط افکنه‌های شماره ۱ الی ۱۲ به دلیل حرکات راست‌الغز راست‌بر ناشی از راندگی گیلان غرب، قسمت فعال مخروط افکنه‌ها و همچنین کانال اصلی قاعده مخروط افکنه در سمت غرب مخروط افکنه‌ها واقع شده‌اند (شکل ۹و). ولی در سایر مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه قسمت فعال مخروط افکنه‌ها در وسط مخروط‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر واقع شدن در امتداد گسل‌های راست‌الغز در دوازده مورد از مخروط افکنه موجب شده است که بخش فعال آنها به سمت غرب جابجا شود، ولی در دیگر مخروط افکنه‌های موجود به دلیل عدم تأثیرپذیری از گسل‌های راست لغز چنین جابه جایی مشاهده نشده و بیشتر بالا آمدگی کوهستان جلب توجه می‌نماید.



شکل ۹: قسمت فعال در سمت غرب مخروط افکنه و عدم تقارن مخروط را نشان می‌دهد

## تأثیر تکتونیک بر موقعیت مجرای اصلی مخروط افکنه و ایجاد مخروط افکنه‌های نامتقارن و خمیده در منطقه‌ی مورد مطالعه

یکی از اثرات دیگر فعالیت‌های راست لغز فعال گسل‌ها روی مخروط افکنه‌ها، ایجاد مخروط افکنه‌های نامتقارن و خمیده نسبت به محور طولی کانال اصلی رودخانه است. (سلیمانی: ۱۳۷۷: ۳۱) مخروط افکنه‌های شمال دشت چله (شماره ۱ الی ۱۲) تحت تأثیر حرکات راست لغز راست بر راندگی گیلان غرب دچار خمیدگی و عدم تقارن شده و مجرای اصلی این مخروط‌ها در سمت غرب آنها واقع شده است (شکل ۹و۸).

### اثرات تکتونیک بر شکل مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه دارای شکل تودرتو هستند که در آن اجزاء جواتر در بین اجزاء قدیمی‌تر قرار گرفته‌اند. این نوع مخروط افکنه‌ها با رسوب‌گذاری جدید در داخل نهشته‌های قدیمی‌تر و تقریباً با توسعه‌ی شعاعی به سمت قاعده مخروط افکنه‌ها مشخص می‌شوند. هان (۱۹۸۹: ۱) عقیده دارد که این نوع مخروط افکنه‌ها بیشتر در یک محدوده‌ی پایکوهی باریک بین یک واحد کوهستانی شدید و متاوب افزایش یافته و یا یک حوضه‌ی پایین رونده شدید دیده می‌شوند. هر چه نرخ فرسایش فعال جبهه‌ی کوهستان نسبت به نرخ حفر قائم رودخانه و نیز نرخ رسوب‌گذاری مخروط افکنه بیشتر باشد، عمل نهشتگی در مناطق نزدیک به رأس مخروط افکنه صورت گرفته و جواترین رسوبات مخروط افکنه در این بخش از مخروط افکنه نهشته می‌شوند (کلر و پیتر ۱۹۹۶: ۲) نقل از (سلیمانی، ۱۳۷۷: ۲۹) در بررسی‌های میدانی به عمل آمده از مخروط افکنه‌های منطقه، رسوبات در قسمت رأس مخروط افکنه‌ها از خروجی دره تا نزدیکی بخش میانی نهشته شده‌اند (شکل ۱۰) بنابراین شکل تودرتو و نهشتگی رأس مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه نتیجه‌ی شرایط تکتونیک فعال منطقه است و قسمت فعال مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه در رأس آنها قرار گرفته است.




شکل ۱۰. نمایی از نهشتگی رسوبات در داخل مخروط افکنه شمال دشت چله (دید رو به شمال)

### نقش تکتونیک در تقطیع شدگی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

شکل گیری مخروط افکنه‌های تقطیع شده از مهمترین شواهد حرکات تکتونیکی فعال در هر منطقه است. محیط انتهایی مخروط افکنه سطح اساس مخروط افکنه را کنترل می‌کند. پایین رفتن سطح اساس در حاشیه‌ی انتهایی مخروط افکنه باعث افزایش شیب کانال‌های مخروط شده و در نتیجه کانال مخروط افکنه‌ها در جهت بالا دست مخروط، بستر خود را حفر می‌کند (ریترو همکاران ۲۰۰۰؛ ۶۳).

ویسراس (۲۰۰۲) در بررسی‌هایی که در مخروط افکنه‌های بیتک اسپانیا انجام داد دریافت که در مناطق با فرونشست تکتونیکی فعال کانال‌های حفر شده و گالی در سطح مخروط افکنه شکل نمی‌گیرد و در این گونه مناطق شاخص‌های  $V_f$  و  $Smf$  حاکی از شدت بالا آمدگی منطقه‌اند. مقادیر شاخص‌های  $V_f$  و  $Smf$  و  $SI$  منطقه حاکی از فعالیت‌های تکتونیکی شدید تا بسیار شدید در هر چهار حوضه است (جدول ۴)، منطقه‌ی مورد مطالعه، بر اساس طبقه بندی شاخص  $Lat$  در کلاس‌های ۱ (چله، کفراور) و کلاس ۲ (گواور، آسمان آباد) قرار می‌گیرند (همدونی و همکاران: ۲۰۰۸: ۱۶۹). مخروط افکنه‌های مورد مطالعه دارای یک کانال فعال‌اند. تقطیع شدگی مخروط‌ها توسط آبراهه‌ی فعال صورت گرفته که به دلیل شرایط تکتونیکی فعال مسیر آن در طول زمان در سطح مخروط جابه‌جا شده است (شکل ۱۱).



شکل ۱۱. نمایی از تقطیع شدگی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی شمال دشت چله

جدول ۴. طبقه‌بندی شاخص‌های ژئومورفیک با استفاده از طبقه‌بندی Lat

نام حوضه	Sl	Vf	Smf	Lat
چله	متغیر	۰/۴۵	۱/۲۵	کلاس ۱
کفراور	متغیر	۰/۵۳	۱/۰۷	کلاس ۱
گواور	متغیر	۰/۴۱	۱/۲۰	کلاس ۲
آسمان‌آباد	متغیر	۰/۵	۱/۲۵	کلاس ۲

بررسی تأثیر تکتونیک بر شکل مخروط افکنه‌ها با استفاده از تحلیل فرمول  $\beta$ :

این فرمول به صورت زیر تعریف می‌شود: (کلرو پیتتر، ۱۹۹۶: ۳۰۱)

در این فرمول

$$\beta = \arccos((\frac{b}{a})^2 \sin^2 a + \cos^2 a)^{0.5}$$

$\beta$ : مقدار خمیدگی مخروط افکنه

$\alpha$ : طول قطر بزرگ

b: طول قطر کوچک

با توجه به این که مخروط افکنه‌ها مخروطی شکل هستند، خطوط منحنی میزان روی مخروط افکنه‌های ساده، که تحت تأثیر فعالیت‌های تکنیکی قرار نگرفته اند، بخشی از دایره را تشکیل می دهند؛ اما منحنی میزان در سطح مخروط افکنه‌هایی که تحت تأثیر حرکات تکنیکی قرار گرفته اند، سطوح بیضی شکلی را تشکیل می دهند، که نشان دهنده تأثیر تکنیک بر مخروط افکنه‌هاست. با استفاده از فرمول بالا، میزان این خمیدگی و عدم تقارن قابل محاسبه است. هر چه خمیدگی مخروط افکنه‌ها در اثر فعالیت تکنیکی زیاد باشد، ضریب به دست آمده ( $\beta$ ) عدد کوچکی را نشان می دهد. جدول (۵) نتایج حاصل از تطبیق منحنی‌های میزان سطح مخروط افکنه‌های منطقه با دایره و بیضی و محاسبه ضریب  $\beta$  را نشان می دهد. با استفاده از داده‌های جدول می توان دریافت که تمامی مخروط افکنه‌های مورد مطالعه بیضی شکل اند.

#### جدول ۵. نتایج محاسبه ضریب $\beta$ برای مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

میزان $\beta$	شکل	شماره مخروط افکنه
۴/۴	بیضی	۱
۴/۳	بیضی	۲
۴/۴	بیضی	۳
۳/۲	بیضی	۴
۲/۸	بیضی	۵
۳/۱	بیضی	۶
۴/۱	بیضی	۷
۳/۳	بیضی	۸
۳/۱	بیضی	۹
۲/۹	بیضی	۱۰
۳	بیضی	۱۱
۳/۶	بیضی	۱۲
۴/۷	بیضی	۱۳
۳/۹	بیضی	۱۴
۴	بیضی	۱۵
۴/۱	بیضی	۱۶

بیشترین مقدار خمیدگی در مخروط افکنه‌های شمال دشت چله در مخروط افکنه‌ی شماره ۵ می‌باشد، که حاکی از فعالیت راندگی گیلان غرب و بالاآمدگی منطقه در نتیجه‌ی مخروط افکنه‌هاست و کمترین مقدار خمیدگی مخروط افکنه شماره ۱۳ در شمال دشت اسمان آباد است که جبهه‌ی کوهستانی تحت تأثیر فعالیت گسل قرار ندارد. در هر حال بررسی شاخص  $\beta$  برای تمامی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه نشان دهنده‌ی تأثیر پذیری شکل مخروط‌ها از فعالیت‌های تکتونیکی منطقه و میزان بالاآمدگی بیشتر نسبت به میزان رسوب گذاری است.

### تأثیر تکتونیک در میزان شیب مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

بلیر و مک فرسون<sup>۱</sup> (۱۹۹۴) شیب سطح مخروط افکنه‌ها را تابع عوامل مختلفی همچون، نوع فرایند تشکیل دهنده، اندازه رسوبات و میزان تأثیر تکتونیک می‌دانند. بلسینباخ<sup>۲</sup> (۱۹۵۴) مخروط افکنه‌ها را در مناطق نیمه خشک به سه گروه پر شیب ( $< 5^\circ$ ) شیب ملایم ( $20^\circ$  الی  $5^\circ$ ) و مسطح ( $> 20^\circ$ ) تقسیم کرد. هوک و روهر (۱۹۷۹) دریافتند که شیب مخروط‌ها معمولاً نسبت معکوسی با مساحت و شعاع مخروط افکنه‌ها دارد به نقل از (مقصودی، ۱۳۸۰: ۲۳۰).

بر اساس تقسیم بندی بلسینباخ مخروط افکنه‌های شماره ۱۱ و ۱۵ در دسته مخروط افکنه‌های با شیب ملایم قرار می‌گیرند و سایر مخروط افکنه‌ها در دسته مخروط افکنه‌های پر شیب جای می‌گیرند. چهارده عدد از مخروط افکنه‌های مورد مطالعه دارای شیب بیش از  $5^\circ$  هستند. مخروط افکنه‌های شماره ۱ الی ۷ در شمال غرب دشت چله به دلیل قرار گرفتن در حریم راندگی گیلان غرب بیشترین شیب را در بین مخروط افکنه‌های منطقه دارند (جدول ۶). ارتباط مشخصی بین شیب مخروط افکنه‌ها و مساحت مخروط‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه وجود ندارد. به طوری که بزرگترین مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه (مخروط‌های شماره ۱۶، ۴، ۱، ۶ و ۵) دارای شیب ( $40^\circ$ ،  $50^\circ$ ،  $63^\circ$ ،  $9^\circ$ ،  $1^\circ$  و  $4^\circ$ ) هستند. بیشترین شیب مخروط افکنه‌های منطقه مورد مطالعه را مخروط افکنه‌های شماره ۷ با شیب  $13/5^\circ$ ، مساحت  $0/44$  کیلومتر مربع که متأثر از فعالیت راندگی گیلان غرب است و کمترین شیب شماره ۱۵ با شیب  $3/6^\circ$  و

۱. Billar and Mc farssen ۱۹۹۴

۲. Blissenbach ۱۹۵۴.



وسعت ۰/۱۳ کیلومتر مربع دارند. هم‌پستگی بین شیب مخروط افکنه‌ها و مساحت آنها (۰/۲۸/۶۷) که نشان می‌دهد، رابطه‌ی معناداری بین آنها وجود ندارد. بنابراین تغییرات شیب و وجود شیب‌های بیش از  $5^{\circ}$  مخروط افکنه‌های منطقه حاکی از فازهای مختلف نهشته گذاری در ارتباط با پدیده بالا آمدگی و فعالیت‌های تکنیکی است و می‌توان گفت که شیب مخروط افکنه‌های منطقه مورد مطالعه متأثر از تکنیک منطقه است.

#### جدول ۶. شیب و تقسیم بندی شیب مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه بر اساس تقسیم بندی بلسینباخ

شماره مخروط افکنه	شیب مخروط افکنه (درجه)	طبقه بندی شیب
۱	۸,۱	پر شیب
۲	۶,۳	پر شیب
۳	۷,۲	پر شیب
۴	۶,۳	پر شیب
۵	۵,۴	پر شیب
۶	۹	پر شیب
۷	۱۳,۵	پر شیب
۸	۵,۴	پر شیب
۹	۵,۴	پر شیب
۱۰	۵,۴	پر شیب
۱۱	۳,۶	شیب ملایم
۱۲	۷,۲	پر شیب
۱۳	۵,۴	پر شیب
۱۴	۹	پر شیب
۱۵	۳,۶	شیب ملایم
۱۶	۵,۴	پر شیب

### تأثیر تکتونیک بر مساحت مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

اندازه مخروط افکنه‌ها به طور وسیعی به اندازه حوضه‌ی آبریز رودخانه وابسته است و بزرگی مخروط افکنه‌ها از ده‌ها متر تا چندین کیلومتر مربع بالغ می‌شود (سونی و لوپ ۲۰۰۱: ۳۳). از ویژگی‌های مخروط افکنه‌های جبهه‌ی کوهستانی فعال، کم بودن مساحت مخروط افکنه‌هاست. جبهه‌های کوهستانی فعال از نظر تکتونیک، جایی که کوهستان نسبت به حوضه‌های مجاور در حال بالا آمدن است، مخروط‌ها به طور عمودی رسوب‌گذاری می‌کنند و باعث کم شدن مساحت مخروط افکنه‌ها نسبت به مساحت حوضه‌هایشان می‌شود (فریل ۱۹۹۶: ۵۶۱). در منطقه‌ی مورد مطالعه، هیچ رابطه‌ی مشخص و منطقی بین مساحت مخروط افکنه و مساحت حوضه آبریز وجود ندارد و هم‌بستگی بین آنها  $0.13 = r$  است، که معنادار نیست. مخروط افکنه شماره ۸ با مساحت  $0.82$  کیلومتر مربع حوضه‌ی آبخیزی به مساحت  $7.42$  کیلومتر مربع دارد، در حالی که مخروط افکنه ۱۶ با وسعت  $1/88$  کیلومتر مربع دارای حوضه‌ی آبخیزی به مساحت  $1/87$  کیلومتر مربع می‌باشد. مقایسه مساحت مخروط افکنه‌ها با وسعت حوضه‌ی آبخیز آنها نشان دهنده کوچک بودن وسعت مخروط‌ها نسبت به حوضه‌های آبریزشان است که حاکی از رسوب‌گذاری عمودی در مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه بر اثر فعالیت‌های تکتونیک است و دلیل مساحت زیادتر مخروط افکنه شماره ۱۶ نسبت به وسعت حوضه‌ی آبخیز خودش دخالت دو گسل امتداد راست لغز راست بر در حوضه‌ی آبخیز آنهاست، که با بریدن تاقدیس قلاجه به صورت عرضی و ایجاد گردنه رسوب فراوان را در اختیار آبراهه‌های تغذیه کننده مخروط افکنه‌ی شماره ۱۶ قرار داده‌اند.


### تأثیر تکتونیک بر نیمرخ طولی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه:

در سیستم‌هایی که ابتدا به وسیله‌ی تکتونیک کنترل می‌شوند، نیمرخ طولی مخروط افکنه‌ها به صورت معقر است (ویسراس و همکاران: ۲۰۰۲: ۱۶۹) نیمرخ طولی مخروط افکنه‌ها برای درک میزان بریدگی

۱. Sweeney and Loope ۲۰۰۰

۲. Ferrill ۱۹۹۶.

و هموار شدگی مخروط افکنه‌ها تهیه می شود (ویلار و رویز؛ ۲۰۰۱: ۱۳۰). نیمرخ طولی هر مخروط افکنه عوامل مؤثر تأثیرگذار را در مورفولوژی مخروط افکنه‌ها قابل درک می نماید. نیمرخ‌های طولی ترسیم شده از مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه، حالت تعقر دارند که نشان دهنده‌ی تأثیر حرکات تکتونیکی بر مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه است (شکل ۱۲).



شکل ۱۲. نیمرخ طولی مخروط افکنه‌های منطقه (الف: مخروط افکنه شماره ۳، ب: مخروط افکنه شماره ۹، ج: مخروط افکنه شماره ۱۳، د: مخروط افکنه شماره ۱۶)

### نتیجه گیری

۱. نحوه‌ی پراکندگی مخروط افکنه‌های بزرگ و شاخص منطقه‌ی مورد مطالعه نشان می دهد که موقعیت مخروط افکنه‌ها ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های تکتونیکی منطقه در دوران پلیو- کوآرتنر دارند به گونه ای که وسیعترین مخروط افکنه‌های منطقه در امتداد راندگی گیلان غرب شکل گرفته اند.

۲. تکتونیک عامل اصلی در شکل‌گیری، توسعه و تحول مخروط افکنه‌های منطقه است که در این میان نقش گسل‌ها بیشتر از سایر عوامل تکتونیکی بوده است و بیشتر مخروط افکنه‌ها در امتداد راندگی گیلان‌غرب یا خروجی دره‌های گسلی منطقه شکل گرفته‌اند.
۳. مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه توسط عوامل تکتونیکی کنترل می‌شود.
۴. با توجه به بررسی‌های میدانی به عمل آمده، سه فاز نهشته‌گذاری در داخل مخروط افکنه‌های منطقه شناسایی گردید. که مربوط به دوران پلیو - کواترنر است و مخروط افکنه‌های منطقه در عصر حاضر در شرایط فرسایشی قرار دارند.
۵. ارتباط معناداری بین شیب مخروط افکنه و مساحت آن و نوع رسوبات آن در منطقه‌ی مورد مطالعه وجود ندارد و شیب مخروط افکنه‌ها توسط عوامل تکتونیکی کنترل می‌شود.
۶. تکتونیک عامل اصلی تأثیرگذار در وسعت مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه است و هیچ ارتباط معناداری بین وسعت مخروط افکنه‌ها با مساحت حوضه‌ی آبریز آنها وجود ندارد.
۷. مخروط افکنه‌ی شماره ۱۶ به عنوان نماینده مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه با فرمول  $AF = 3 - 34 \times Adn$ ، هم‌خوانی دارد که نشان دهنده‌ی مخروط افکنه‌های شکل گرفته در جبهه‌های کوهستانی فعال است و شاخص‌های  $SL, VF, Smf$  و کفراور ضریب  $\beta$  این مخروط افکنه این موضوع را تأیید می‌کنند. همچنین این مخروط افکنه دارای نسبت عرض به طول ۱/۱۶ است که با توجه به مطالعات (ویسراس و همکاران: ۲۰۰۲: ۱۹۷) چنین مخروط افکنه‌هایی در شرایط تکتونیکی فعال شکل گرفته‌اند.
۸. نیمرخ مقعر مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه نشان دهنده‌ی فعال بودن حرکات تکتونیکی در زمان شکل‌گیری مخروط افکنه در دوران کواترنر است.

## توضیحات

۱. شاخص گرادیان طول رودخانه ( $SL$ ) که در برآورد تکتونیک فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد و از رابطه‌ی  $SL = (\Delta H / \Delta L) \cdot L$  به دست می‌آید.
۲. شاخص نسبت پهنای کف دره به عمق دره که از رابطه‌ی  $Vf = 2Vfw / (Eld - Esc) + (Erd - Esc)$  به دست می‌آید.
۳. شاخص سینوسی جبهه کوهستان ( $smf$ ) که از رابطه‌ی  $Smf = Lmf / Ls$  به دست می‌آید.
۴. شاخص  $Lat$  به وسیله‌ی میانگین کلاس‌های مختلف شاخص‌های ژئومورفیک ( $S/n$ ) به دست می‌آید.

۵. شاخص عدم تقارن حوضه‌ی آبخیز که از رابطه‌ی  $100 \cdot Af = (Ar/At)$  به دست می‌آید.

## منابع و مآخذ

۱. تصاویر ماهواره IRS- متعلق به سال ۲۰۰۴.
۲. سلیمانی، شهریار، (۱۳۷۷)، *رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان* "با نگرشی بر مقدمات دیرینه شناسی"، تهران: انتشارات مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، چاپ اول: ۱۲۵.
۳. عباس نژاد، احمد، *پژوهش‌های ژئومورفولوژی دشت رفسنجان*. (۱۳۷۵). رساله‌ی دکتری دانشگاه تبریز.
۴. عکس هوایی ۱:۵۰۰۰۰، (۱۳۳۵)، شماره‌های ۸۵۴۱ ۸۵۴۲ ۸۵۴۳ ۳۵۸-۳۵۶ و ۳۷۰-۳۶۴ منطقه مورد مطالعه.
۵. مقصودی، تهران (۱۳۸۰). *ژئومورفولوژی مناطق خشک بررسی متغیرهای مؤثر بر تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه‌های چاله سیرجان؛ پایان نامه‌ی دکتری دانشگاه تهران*.
۶. نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ کال کش، (۱۳۷۶)، برگه شماره ۵۲۵۸ III، چاپ سوم، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
۷. نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ایوانغرب، (۱۳۸۵)، برگه شماره ۵۲۵۷، سازمان زمین شناسی.
۸. نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ایلام، (۱۳۸۵)، برگه شماره ۵۲۵۷، سازمان زمین شناسی.
۹. نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ کرند، (۱۳۸۴)، برگه شماره ۵۲۵۸، سازمان زمین شناسی.
۱۰. Blance, E , Allen,M , Inger,S, Hassani,H, (۲۰۰۳), *structural styles in the Zagros simple folded zone Iran*, geological society, vol ۱۶۰, pp: ۴۰۱-۴۱۲.
۱۱. Ferrill, D.A., Stakamatos, J.A., Jones, S.M., Rahe, B., McKague, H.L., Martin, R.H., Morris, A.P., ۱۹۹۶. *Quaternary slip history of the Bare Mountain fault (Nevada) from the morphology and distribution of alluvial fan deposits*. Geology ۲۴, ۵۵۹-۵۶۲.
۱۲. Hamdouni, R.El. Iriggaray, C. Fernandez, T. Chacon, J. Keller, E.A.(۲۰۰۸). *Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (Southern Spain)*. Geomorphology. Vol ۹۶. pp: ۱۵۰-۱۷۳.
۱۳. Han, M. (۱۹۶۱). *Tectonic Geomorphology and its application to earthquake prediction in chinain: tectonic geomorphology*, ed by: morisawa & Hach, J.T., unwin Hyman, Boston pp: ۳۶۷-۳۸۶.
۱۴. Harvey, A. (۲۰۰۲). *The role of base- level change in the dissection of alluvial fans: Case studies from Southeast Spain and Nevada*. Geomorphology. Vol ۴۵. pp: ۶۷-۸۷.

۱۵. Hessami, KH, Nilfouyoushan, Christopher. J, Tablot, (۲۰۰۶), *active deformation within the Zagros Mountains deduced GPS measurements, geology society*, Vol ۱۶۳, pp: ۱۴۳-۱۴۸.
۱۶. Li, Youli. Yang, Jingchun. Tan, Lihua. Duan, Fengian (۱۹۹۹). *Impact of tectonics on alluvial landforms in Hexi corridor, Northwest China*. Geomorphology Vol ۲۸. pp: ۲۹۹-۳۰۸.
۱۷. M. Harvey, A. G. Silva, P. E. Mather, A. L. Goy, J. Stokes, M. Zazo, Cari. (۱۹۹۹). *The impact of Quaternary sea-level and climatic change on coastal alluvial fans in the Cabo de Gate ranges, southeast Spain*. Geomorphology, Vol ۲۸. pp: ۱-۲۲.
۱۸. Ritter, J. Miller, J. walforst, J. (۲۰۰۰). *Environmental controls on the evolution of alluvial fans in Buena Vista Valley, North Central Nevada, during late Quaternary time*. Geomorphology. Vol ۳۶. pp: ۶۳-۸۷.
۱۹. Sweeney, M. Loope, D. (۲۰۰۱). *Holocene dune- sourced alluvial fans in the Nebraska sand hills*. Geomorphology. Vol ۳۸. pp: ۳۱-۴۶.
۲۰. Valvo, M. Antronico. Pera, E. (۱۹۹۸). *Controls on modern fan morphology in calabria, Southern Italy*. Geomorphology. Vol ۲۴. pp: ۱۶۹-۱۸۷.
۲۱. Vilar, G. Ruiz, G (۲۰۰۰). *Surface sediment characteristics and present dynamics in alluvial fans of the central Spanish Pyrenees*. Geomorphology. Vol ۳۴. pp: ۱۲۷-۱۴۴.
۲۲. Viserace, C. calvache, M. soria, J. Fernandez, J. (۲۰۰۳). *Differential features of alluvial fans controlled by tectonic or eustatic accommodation space*. Examples from the Betic Cordillera, Spain. Geomorphology. Vol ۵۰. pp: ۱۸۱-۲۰۲.
۲۳. Yang, J.C. (۱۹۸۵). *Geomorphology (in Chinese)*. High Education press. Beijing. Pp: ۳۲۰.